



INSERT FOR PHARMACEUTICAL PRODUCT (Ref. SOP RA-060)

DELINE® CORT Syrup

Dear patient,

Please read the following instructions carefully. They contain important information about the use of this medicine. If you have any further questions, please ask your doctor or pharmacist.

Information about DELINE CORT

Each 5 mL of DELINE CORT syrup for oral use contains 5mg desloratadine and 0.25mg betamethasone. The excipients are: sorbitol solution, sodium benzoate, sodium citrate, citric acid anhydrous, disodium edetate, banana flavor, sugar, propylene glycol, and purified water.

Desloratadine is a long-lasting, non-sedative antihistamine used to relieve allergy symptoms.

Betamethasone is a corticosteroid used to relieve inflammation in various conditions.

DELINE CORT is indicated for the treatment of severe allergic conditions such as:

seasonal and perennial allergic rhinitis, atopic dermatitis, allergic contact dermatitis, urticaria, angioedema, food and medicines allergies and eye allergies such as allergic conjunctivitis.

The way to take DELINE CORT

Take DELINE CORT as directed by your physician.

The usual recommended doses are:

Age	Dose
Adults and children 12 years of age and older	5 mL once daily
Children 6 to 11 years of age	2.5 mL once daily
Children 2 to 5 years of age	1.25 mL once daily

- The dose can be taken with or without meals.
- Depending on the patient's response, dosage adjustment may be necessary.
- Dosage adjustment is recommended for patients with renal or hepatic impairment.

In case of overdose

In case of intake of high doses of this medication, inform your doctor at once and seek emergency medical attention. General measures should be adopted.

In case of missed dose

If you miss taking your dose on time take it when you remember. Do not exceed more than one dose in 24 hours.

Contraindications

This drug is contraindicated in the following conditions:

- Hypersensitivity to any of the components
- Hypersensitivity to other corticosteroids
- Systemic fungal infection
- Active tuberculosis

Precautions

- Do not stop taking this medicine without first checking with your doctor. The treatment should be discontinued gradually.
- Caution should be taken in case of severe renal or hepatic insufficiency.



INSERT FOR PHARMACEUTICAL PRODUCT (Ref. SOP RA-060)

- Inform your doctor in case you have liver or kidney disease, high blood pressure, infection, myasthenia gravis, glaucoma, osteoporosis, stomach or duodenal ulcer or recently had contact with someone who has chickenpox, shingles or measles.
- Your doctor may instruct you to follow a diet rich in potassium and calcium and low in sodium.
- Do not receive any immunizations (vaccines) during treatment without first talking to your doctor.
- Inform your doctor if you develop fever or other signs of infection.
- It is recommended to monitor frequently serum potassium levels, glucose level, blood pressure and perform periodic eye examination during long-term treatment with corticosteroids.
- Growth and development of children on prolonged therapy should be carefully observed.
- Contact your doctor before using this medication in case of pregnancy or lactation.

Associations with other medications

Please inform your doctor if other medicines are being taken or have been taken recently. Caution should be used when administered with phenobarbital, phenytoin, rifampicine, ephedrine, amphotericin B, non-steroidal anti-inflammatory drugs, salicylates, estrogens, antidiabetics, somatrophin, potassium depleting diuretics, cardiac glycosides or coumarin-type anticoagulants.

Adverse reactions

The most commonly reported adverse effects include: Headache, pharyngitis, fatigue, somnolence, dry mouth, flu-like symptoms, myalgia, nausea, dizziness, dyspepsia and mood changes. Please inform your doctor if any adverse reaction appears or becomes bothersome.

Storage

Store at controlled room temperature (below 30°C), protected from light and humidity, beyond the reach of children. The expiry date is printed on the pack; don't use this medicine after this date.

Pack Presentation

DELIN CORT syrup, desloratadine 5mg/ 5mL and betamethasone 0.25mg/ 5ml, bottle of 60 mL with a dosing cup.

Issue date: 07/2021

DENS/001

Manufactured by Mediphar Laboratories -Lebanon

For further information, visit our company's web site: www.medipharlabs.com or call the "Consumer Healthcare Service" at 961-4-540056.

ديلين® كورت شراب

الرجاء قراءة هذه التعليمات بدقة، فهي تتضمن معلومات هامة قد تحتاج إليها عند استعمال هذا الدواء. إذا كانت لديك أية أسئلة فلا تتردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

علاج ديلين كورت

يحتوي كل ٥ ملل من ديلين كورت شراب للاستعمال الفموي على ٥ ملغ ديسلوراتادين و ٠,٢٥ ملغ بيتاميتازون. المواد الغير فعالة: محلول السوربيتول، بنزوات الصوديوم، سترات الصوديوم، حمض الستريك، إديتات ثنائي الصوديوم، نكهة الموز، سكر، بروبيلين غليكول، وماء نقي. ديسلوراتادين هو مضاد للهستامين طويل المفعول، لا يسبب النعاس يستعمل لتخفيف الحساسية وأعراضها. بيتاميتازون هو كورتيكوستيرويد له مفعول مضاد للالتهاب يستعمل في حالات متعددة.

**INSERT FOR PHARMACEUTICAL PRODUCT**

(Ref. SOP RA-060)

يستعمل ديلين كورت في علاج حالات الحساسية الحادة مثل: التهاب الأنف التحسسي الموسمي والماكث، التهاب الجلد التأتبي، التهاب الجلد التماسي التحسسي، الخبز الوعائي، الشرى، الحساسية بسبب الطعام والأدوية والحساسية في العيون مثل التهاب الملتحمة التحسسي.

الجرعة التي يجب تناولها

الرجاء اتباع التعليمات المحددة بهذا الشأن.
الجرعات المعتمدة هي:

العمر	الجرعة
الكبار والأولاد من عمر ١٢ سنة وما فوق	٥ ملل مرة في اليوم
الأولاد من عمر ٦ سنوات إلى ١١ سنة	٢,٥ ملل مرة في اليوم
الأولاد من عمر سنتين إلى ٥ سنوات	١,٢٥ ملل مرة في اليوم

- يمكن تناول الجرعة مع أو بدون الطعام.

- يمكن تعديل الجرعة بحسب استجابة المريض.

- يجب تعديل الجرعة في حالات قصور الكلى أو الكبد.

في حال الإفراط في الجرعة

إذا تناولت جرعات إضافية من هذا الدواء أعلم طبيبك ليتم العلاج وفقاً للأعراض.

في حال نسيان تناول الدواء

إذا نسيت أن تتناول الدواء في الوقت المحدد تناوله في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. لا تتناول أكثر من جرعة واحدة خلال ٢٤ ساعة.

موانع الاستعمال

لا يجب استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- الحس المفرط لأي من المكونات

- الحس المفرط للكورتيكوستيرويدات الأخرى

- التهابات فطرية في الجسم

- مرض السل النشط

الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تناول هذا الدواء

- لا يجب إيقاف العلاج قبل استشارة الطبيب، يجب أن تخفف الجرعة تدريجياً قبل إيقاف العلاج.

- يجب توخي الحذر عند تناول هذا الدواء في حال وجود قصور حاد في الكلى أو في الكبد.

- أعلم طبيبك في حال وجود مرض في الكبد أو الكلى، ارتفاع ضغط الدم، عدوى، وهن عضلي، غلوكوما، هشاشة العظام، قرحة المعدة أو القرحة العفجية، يجب تجنب التعرض لجذري الماء، الحزام الناري أو للحصبة.

- قد ينصحك الطبيب باتباع حمية غذائية غنية بالكالسيوم والبوتاسيوم وذات كميات قليلة من الصوديوم.

- لا يجب تلقي أي لقاحات أثناء العلاج دون التحدث أولاً إلى الطبيب.

- أعلم طبيبك إذا ظهر أي من عوارض العدوى مثل الحرارة.

- من المستحسن مراقبة مستويات البوتاسيوم في الدم ومستوى الجلوكوز وضغط الدم وإجراء فحص العين الدوري خلال العلاج على المدى الطويل مع الكورتيكوستيرويدات.

- يجب مراقبة نمو الأطفال خلال العلاج على المدى الطويل.

- يجب إعلام الطبيب قبل استعمال هذا الدواء أثناء الحمل والرضاعة.

استعمال ديلين كورت مع غيره من الأدوية

يستحسن إعلام الطبيب أو الصيدلي عن الأدوية التي تستعملها.

يجب الحذر عند تناول هذا الدواء مع الفينوباربيتال، فينيتوين، ريفمبسين، الايفيدرين، أمفوتريسين ب، مضادات الالتهاب غير

الستيرويدية، الساليسيلات، هرمون الأستروجين، مضادات السكري، سوماتروبين، مدرات البول المستنفدة للبوتاسيوم، جليكوسيدات

الديجيتال أو مضادات التخثر الفموية.

التأثيرات الجانبية

من العوارض الجانبية الأكثر حدوثاً: صداع، التهاب البلعوم، تعب، نعاس، جفاف الفم، أعراض شبيهة بعوارض الانفلونزا، ألم في

العصل، غثيان، دوار، عسر الهضم وتغير في المزاج.

أعلم طبيبك في حال حدوث أي عوارض جانبية أو انزعاجك منها.

طريقة الحفظ



INSERT FOR PHARMACEUTICAL PRODUCT
(Ref. SOP RA-060)

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال، بعيداً عن الضوء وعن الرطوبة في حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية. تاريخ انتهاء الصلاحية مطبوع على العبوة، لا تستخدم هذا الدواء بعد هذا التاريخ.

العبوة

ديلين كورت شراب، ديسلوراتادين ٥ ملغ/ ٥ ملل و بيناميتازون ٠,٢٥ ملغ/ ٥ ملل، عبوة تحتوي على ٦٠ ملل مع مقياس للجرعة
تاريخ صدور المعلومات: ٢٠٢١ / ٠٧

تصنيع مختبرات مدي فار - لبنان

لمزيد من المعلومات اتصل بشبكة الانترنت على الموقع: www.medipharlabs.com
أوب : "Consumer Healthcare Service" على الرقم التالي: ٩٦١-٤ - ٥٤٠٠٥٦

® Registered Trade Mark

THIS IS A MEDICAMENT	
-	Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
-	Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament. The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
-	Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
-	Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
	Keep medicament out of the reach of children. إن هذا دواء
-	الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
-	الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
-	اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
-	فالتبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينفعه وضرره.
-	لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
-	لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.
	لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد صيادلة العرب
Council of Arab Health Ministers & Union of Arab Pharmacists

Mediphar logo

Dimensions: 170 x 146 mm

APPROVALS		
Position	Signature	Date
RA supervisor		
R&D Manager/ formulation supervisor		
QC manager		
PA manager		